

ORSZÁGOS BALESETI ÉS SÜRGŐSSÉGI INTÉZET
1081. BUDAPEST VIII., FIUMEI ÚT 17.
Telefon: Központ: 299-7700

Budapesti
Nyomozó Ügyészség
1461 Budapest
Pf. 65
Szám:
T.szám:

Ikt.sz.:

Orvosi Látogatás és vélemény

A sérült neve: Török Imre
Születési helye és ideje:
Anyja leánykori neve:
Lakcíme:

Az orvosi ellátásra jelentkezés ideje: 2006. év 09. hó 20. nap 05:04 óra
Ellátó orvos:

Sérüléssel összefüggő panaszok: Vizsgálata napján Nemzeti Nyomozóirodából szállítják, dereka, feje jobb térdre sérült. Esméletvesztése nem volt. Rendőri intézkedés történt. OMSz szállítja Intézetünkbe.

Jelen állapot

Fej,nyak: Jobb alsó és felső szemhéj duzzadt, suffundált, szemrést feltárva látási zavart nem panaszol, orrgyök duzzadt, fájdalmas, ornyílások körül beszáradt vér, felső orbitakeret nyomásérzékenység, nyak mozgásai szabadok.

Mellkas: Stabil, fájdalommentes, ritmusos szívhangok, puhasejtes alaplégzés.

Has medence: Puha, betap, fájdalommentes, lumb. gerinc fájdalommentes, medence stabil, fájdalommentes. Bal paravert. régió vese magasságában fájdalmas.

Végtagok: Jobb patela felett duzzanat, nyomásérzékeny, KÉM megtartott, szalagos instab nem észlelhető.

Az idegrendszeri állapot (reflexek, Romberg-tünet, pupillák stb.), valamint az agyrázkódásra utaló tünetek (eszméletvesztés, emlékezet-kiesés, vegetatív tünetek): Organikus neurológiai eltérés nélkül, pupillák kp. tágak, szimmetrikusak, fényre reagálnak, tudata tiszta, térben, időben orientált, vegetatív tünet nincs.

Az alkoholos állapot fizikális jelei (alkoholos lehelet, arcbőr, kötőhártyák állapota stb.) és a psychés tünetek (beszéd, magatartás, tájékozódás, emlékezőképesség stb.) -----

A szakorvosi leletek (rtg. stb.) részletes feltüntetése:

L. gerinc: az L. II-III. csigolyák baloldali proc. transversusán haránttörések láthatók. Az L. III. csigolya törése régebbi keletűnek imponál. A többi ábrázolt csonton fractura nem látható.

Mellkas: A mellkas felv. technikai hiba miatt nem értékelhető.

Kórisme (latinul és magyarul): Fractura proc. transv. vert. lumb. I-II-III. I.s. Contusio renis s? Contusio nasi. Haematoma periorbitale I.s. Contusio et abrasio gen. d. Baloldali I-II-III csigolyanyúlvány törése. Baloldali vesezúzódás? Az orr zúzódása. Baloldali szemkörüli vérömleny. Jobboldali térd zúzódása és horzsolódása.

Vélemény: A gyógytartam szövődménymentes gyógyulás esetén előreláthatólag 8 napon belüli, - 8 napon túli, kb. nap.

Megjegyzés: (pl. várható-e maradandó testi fogyatékoság vagy súlyos egészségromlás):

A sérülést követő egy év után történő orvosi felülvizsgálat alapján lehet nyilatkozni.

Budapest, 2006. év 11. hó 27. nap.

Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet
Módszertani osztály
1081 Bp. VIII., Fiumei út 17.
Fax: 334-3179 Tel.: 333-7599
1430 Bp., Pf.: 21.